

BS スケール指示フォーミュラリ

2025.10 作成

クリニカルパス委員会 薬剤部

【監修】 血液内科 林 俊輔

【 高血糖時 】

血糖測定時に血糖値が高値を示した場合、ヒューマリン R（以下、HR）を決められた量投与すること

※欠食時・食事量低下時は BS201 以上から適用する

< 体重：50kg 未満 >

血糖値：150～200	→	HR：1 単位
血糖値：201～250	→	HR：2 単位
血糖値：251～300	→	HR：3 単位
血糖値：301～350	→	HR：4 単位
血糖値：351～400	→	HR：5 単位
血糖値：401 以上	→	HR：6 単位

< 体重：50kg 以上 >

血糖値：150～200	→	HR：2 単位
血糖値：201～250	→	HR：3 単位
血糖値：251～300	→	HR：4 単位
血糖値：301～350	→	HR：5 単位
血糖値：351～400	→	HR：6 単位
血糖値：401 以上	→	HR：7 単位

< 手術日を含め 3 日間 >

血糖値：150～200	→	HR：3 単位
血糖値：201～250	→	HR：4 単位
血糖値：251～300	→	HR：5 単位
血糖値：301～350	→	HR：6 単位
血糖値：351～400	→	HR：7 単位

血糖値：401 以上 → HR：8 単位

【 低血糖時 】

血糖測定時に血糖値：70 以下を示した場合、患者の状態に即した対応をすること

- 内服可能で意識障害等の低血糖症状なし

→ ブドウ糖 10 g 内服、1 時間後再度測定

※1 時間後も血糖値：70 以下が続く場合は以下の内服困難時の対応を実施

- ◆ 内服困難、もしくは意識障害等の低血糖症状がある

→ 大塚糖液 50% (20mL) を 2A (40ml) 静注し、1 時間後再度測定