

悪心嘔吐時フォーミュラリ

2025.12 作成

クリニカルパス委員会 薬剤部

【監修】 消化器内科 横山雄一郎

内服可能時

- メトクロプラミド錠 5mg 1錠

→ 1回量は2錠まで増量可能 (1日最大・7錠)

※消化管に出血、穿孔又は器質的閉塞のある患者は禁忌のため注意すること

内服不能時、術後悪心嘔吐高度の場合

- メトクロプラミド注 10mg + 生食 20ml 静脈内投与

※消化管に出血、穿孔又は器質的閉塞のある患者は禁忌のため注意すること

- ナウゼリン坐剤

3才未満の場合、通常ドンペリドンとして1回 10mg を直腸内に投与する。

3才以上の場合、通常ドンペリドンとして1回 30mg を直腸内に投与する。

成人は通常、ドンペリドンとして1回 60mg を直腸内に投与する。

※妊婦には使用を控えること

※消化管出血、機械的イレウス、消化管穿孔の患者には禁忌

※プロラクチン分泌性の下垂体腫瘍（プロラクチノーマ）の患者には禁忌


上記対応で悪心嘔吐が改善しない場合は主治医へ指示を仰ぐこと

院内フォーミュラを活用した【悪心嘔吐時】フローチャート

2025.11作成

クリニカルパス委員会 薬剤部

【監修】 消化器内科 横山雄一郎



※上記対応で悪心嘔吐が改善しない場合、
消化管に出血、穿孔又は器質的閉塞がある場合は
主治医へ指示を仰ぐこと